

PROTAC SF

TECHNISCHE FICHE

Plagen

- Bladluis
- Spintmijt
- Roestmijt
- Trips
- Witte vlieg
- Perenbladvlo
-

Gewassen

- Tomaat
- Komkommer
- Paprika
- Andere groenten
- Zacht fruit
- Sierteelt
- Fruitbomen
-

Wat is PROTAC SF?

- Product met een fysieke werking (immobilisatie) ter bestrijding van een breed scala aan herbivore insecten en mijten.

Formulering

- Mengsel bestaat uit polymeren, vooral silicone polymeren, siloxanen en organische antioxidanten.

Werkingsmechanisme

- Wanneer aangebracht op gewassen vormen de polymere stoffen een dun, kleverig net op het lichaamsoppervlak van herbivore insecten en mijten. De structuur immobiliseert hen onmiddellijk en elimineert ze snel.

Gebruik

Bereiding van de spuitoplossing

- Om schuimvorming te voorkomen, vul eerst de tank met de totale benodigde hoeveelheid water en voeg vervolgens PROTAC SF toe en meng de oplossing.
- Gebruik de spuitoplossing binnen 24 uur na bereiding.
- Indien nodig, water bufferen tot pH 4,0 - 7,5.
- Meng PROTAC SF niet met andere producten of toevoegingsstoffen/hulpstoffen.
- Overschrijd de aanbevolen dosis niet.

Gebruik

Toepassing

- Toepassingstijdstip: PROTAC SF werkt voornamelijk tegen mobiele stadia van de plaag. Voor een optimale controle, toepassen bij de eerste tekenen van de plaag.
- Laatste toepassingstijd: geen beperkingen.
- PROTAC SF heeft geen restactiviteit en is geen preventieve maatregel. Bij hoge plaagdruk, opnieuw toepassen na minimaal 7 dagen.
- Om het risico op bladbeschadiging (fytotoxiciteit) te minimaliseren, wordt aangeraden om te behandelen op momenten dat het gewas snel kan opdrogen (bijv. overdag bij een lage luchtvochtigheid).
- Niet toepassen bij hoge luchtvochtigheid, 's nachts of op bewolkte dagen.
- Niet opgedroogde sproeivloeistof die langer dan een paar uur op de bladeren achterblijft, kan de bladeren van gevoelige gewassen (bijv. appel, peer, tomaat, Cucurbitaceae) beschadigen.
- Spuit op droog gewas. Spuit de planten tot ze nat zijn, maar zonder noemenswaardige run-off. Spuit niet vlak voor regen (als er binnen 5 uur regen verwacht wordt) en niet 's avonds voor nachtdauw. Spuit niet op bloeiende gewassen, bloemblaadjes kunnen beschadigen.
- Fytotoxiciteit kan ook optreden bij een zeer gevoelig jong gewas (bijv. zaailingen).
- Wacht minimaal 7 dagen tussen herhaalde toepassingen van PROTAC SF.
- Er moet een interval van 5 dagen zijn tussen PROTAC SF en Captan toepassingen, wegens het risico op fytotoxiciteit. Het wordt aanbevolen om een kleinschalige test uit te voeren op een beperkt aantal planten, voorafgaand aan grootschalig gebruik, vooral in het geval van gevoelige gewassen.

Dosis en toepassingstijdstip

Raadpleeg het etiket.

Producteigenschappen

1L verpakking

Bewaring

Bewaard in een droge omgeving tussen 0 en 35°C is het product 4 jaar houdbaar na productiedatum.

DISCLAIMER

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.